



Fiche information SSEJ - PPSP

AUTO-INJECTEUR D'ADRENALINE

No de la Fiche : D359

Responsable : PPSP – Médecin chef-f-e de service Pratiques

Public : équipe éducative SAPE

Personne de référence PPSP : Médecin répondant pour la Petite enfance ; Infirmier-ère-s de la petite enfance

Rattaché au MOP/à la procédure (ou macro processus) :

Date de validation : 12.2020

A. Introduction

Qu'est-ce qu'un auto-injecteur d'adrénaline ?

L'auto-injecteur d'adrénaline est un dispositif simple d'emploi utilisé pour le traitement d'urgence d'une réaction anaphylactique grave (allergique sévère avec œdème de Quink).

À usage unique, il est personnel et est prescrit aux personnes ayant une allergie confirmée. Son dosage est adapté au poids et à l'âge de son utilisateur.

Il existe plusieurs modèles de divers fabricants. Les plus fréquents sont Jext® et Epipen®. Le principe d'utilisation des auto-injecteurs est similaire d'une marque à l'autre.

B. Consignes aux équipes éducatives et enseignants-es

1. Utilisation de l'auto-injecteur d'adrénaline : quand faut-il l'utiliser ?

Sur prescription médicale lors d'une réaction allergique sévère avec un ou plusieurs symptômes suivants :

- difficultés respiratoires,
- enflure du cou et/ou de la face,
- voix rauque,
- difficultés à avaler,
- lèvres et extrémités bleues,
- perte de connaissance.

2. Conseils généraux :

Mettre une copie du PAI avec les médicaments.

Prendre connaissance du mode d'emploi à la réception du médicament, hors situation de stress.

Noter le numéro d'urgence 144 et celui des parents sur votre téléphone.

L'auto-injecteur doit toujours être à portée de main.

3. Mode opératoire général :

- a. Installer l'enfant de façon à pouvoir l'immobiliser.
- b. Ôter le bouchon de sécurité pour déverrouiller l'auto-injecteur.
- c. Placer l'extrémité d'injection (noire ou orange) sur la face extérieure de la cuisse comme un poinçon. L'injection est possible même à travers le pantalon.
- d. Appuyer fortement jusqu'au déclic, maintenir en comptant jusqu'à 10 dans cette position (environ 10 secondes).
- e. Retirer l'auto-injecteur et masser le site d'injection. Noter l'heure de l'injection.
- f. Tout de suite après l'injection, appeler le n°144.
- g. Avertir les parents et rester auprès de l'enfant pour le surveiller et le réconforter.

En cas de perte de connaissance, mettre en position latérale de sécurité.

C. Références et/ou source d'information complémentaire

Guide pratique d'utilisation de l'auto-injecteur Jext® :

https://www.jext.fr/pdf/guide_pratique_utilisation_jext.pdf

Site Epipen®: <https://www.epipen.fr/>

Compendium suisse des médicaments : <https://compendium.ch>