



BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°6 du 07 mai 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot

Météorologie – Phénologie



G : Boutons floraux agglomérés

Sauvignon Blanc, Satigny. 06.05.26

- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade G : boutons floraux agglomérés**. La précocité peut varier selon le cépage ou la localisation d'une parcelle.
- Le 1 et 2 mai ont été des journées ensoleillées et sèches. Depuis le 3 mai, les conditions météorologiques sont plus instables et plus humides. De nombreuses averses sont tombées sur le canton totalisant plusieurs litres d'eau en 3 jours (tableau ci-dessous). Des **T°C plus fraîches entre 9°C et 18°C**.

	Lully	La Plaine	Anières	Satigny	Soral
4-6.05	35mm	36mm	37mm	36mm	35mm

- Les journées du 07 au 10 mai s'annoncent sèches et ensoleillées avant le retour d'un temps instable dès le 10.05 avec des potentielles pluies. Des **T°C entre 8°C et 24°C** sont prévues sur le canton.

Mildiou

- **Rappel : les pluies entre le 28.04 et le 29.04 ont déclenché l'infection primaire sur l'ensemble des stations Agrométéo du territoire genevois**

Deux scénarios possibles

Premier traitement effectué après les pluies contaminatrices du 28.04.-29.04

Encore aucun traitement effectué

Total de >35mm entre le 04.05 et le 06.05

=

Les produits appliqués sont complètement lessivés

Total de >35mm entre le 04.05 et le 06.05

=

Toutes les conditions ont été réunies pour déclencher une infection

Traitement à renouveler / Premier traitement à effectuer avant les prochaines averses

- Après les nombreux litres tombés, l'ensemble de la couverture phytosanitaire est lessivé au sol. Une fenêtre météo idéale est présente cette fin de semaine pour un renouvellement de la protection. Les conditions semblent propices entre le 08.05 et le 09.05 avant le retour d'éventuelles pluies.
- En ce début de saison, il est très important de ne laisser aucune porte d'entrée à la maladie afin d'éviter de courir toute la saison derrière des foyers établis.
- Il est primordial de surveiller la tendance météorologique pour éviter toutes mauvaises surprises et surtout de se munir d'un pluviomètre.
- Agrométéo propose un [modèle pour la maladie](#) avec les différentes infections selon les conditions météorologiques.
- **RAPPEL :**
 - La période pré-florale est capitale pour la lutte anti-mildiou, aucune faille ne doit résider dans le programme de traitement. Il faut toujours considérer la dilution des produits de traitements dû à la croissance végétative de la vigne et aux averses.
 - **Produits de contact :** il est déconseillé de dépasser les 6-7 jours d'intervalle entre deux traitements. Si la protection phytosanitaire arrive au bout de son efficacité, il est nécessaire de réitérer le traitement phytosanitaire avant et au plus proche des prochaines pluies. Lessivage : 15-20mm. Un orage court et très intense à une capacité de lessivage important.
 - **Produits pénétrants ou systémiques :** il est déconseillé de dépasser les 8-10 jours d'intervalle entre deux traitements. Lessivage : 40mm.

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 100g et 150g de cuivre métal par hectare.

Stratégie viticulture PI :

Un traitement entre 1kg/ha et 1.25kg/ha de folpet. Il est nécessaire de consulter l'index phytosanitaire pour le dosage des autres matières actives.

Oïdium

- Pour le moment, la pression face à l'oïdium n'est pas encore très importante mais l'humidité de ces derniers jours va faire augmenter le risque face à la maladie.
- Tout comme pour le mildiou, il est nécessaire de ne laisser aucune porte d'entrée à l'oïdium. Le programme de traitement doit être irréprochable et sans faille dès ce stade sensible de la vigne.
- Il ne faut prendre aucun risque en ce début de saison et appliquer un traitement anti-oïdium dès cette fin de semaine à la vue de la forte croissance de la vigne ces dernières semaines.
- Agrométéo propose également un [modèle pour la maladie](#) avec les risques selon les conditions météorologiques.
- **Rappel :**
 - Une bonne application de traitement est primordiale, mais il faut rappeler également que les mesures préventives sont des aides redoutables sur les zones sensibles face à la maladie :
 - un ébourgeonnage efficace
 - une aération de la zone de la grappe importante pour une meilleure pénétration des produits

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable à entre 3kg/ha et 4kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- Les premières infections de la maladie se sont déroulées lors des pluies du 28.04. et 29.04. La seconde vague d'infection est survenue après les pluies du 04.05 au 06.05.
- Selon le [modèle d'Agrométéo](#), l'infection est considérée comme faible pour le moment.
- La lutte contre le black-rot est à résonner de la même manière que celle du mildiou : **il est nécessaire de protéger les pluies contaminatrices. En cas de foyer, il est donc primordial de positionner un traitement au plus proches des futures pluies pour éviter une nouvelle contamination.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 300g de cuivre métal par hectare couplé avec la dose maximale autorisée en soufre mouillable au stade phénologique du moment, 4kg/ha.

Stratégie viticulture PI :

Pour des conseils de traitements ou matières actives, il est possible de nous contacter. À savoir que les doses des différentes matières actives ainsi que leurs doses d'emploi sont disponibles dans l'index phytosanitaire.