



BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°7 du 12 mai 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot

Météorologie – Phénologie



G : Boutons floraux agglomérés

Chasselas, Satigny. 12.05.26

- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade G : boutons floraux agglomérés**. La précocité peut varier selon le cépage ou la localisation d'une parcelle.
- Des orages localisés se sont déversés sur Genève le 08.05, entre 0 et 7mm au total selon les stations Agrométéo.
- Les conditions météorologiques du samedi 09.05 ont été idéales pour positionner un traitement phytosanitaire avec un temps ensoleillé et sec.
- Dès dimanche 10.05, d'intenses averses sont survenues en journée et durant la nuit du 10.05, puis pendant la journée du 11.05. Des T°C entre 5°C et 24°C.

	Lully	La Plaine	Anières	Satigny	Soral
10-11.05	24mm	20mm	16mm	22mm	37mm

- Les journées du 12 et 13 mai s'annoncent sèches et ensoleillées avant le retour de possibles averses dès le 14.05 (entre 10mm et 20mm). Des T°C fraîches entre 6°C et 14°C sont prévues sur le canton.

Mildiou

28/29 avril

4/6 mai

10/11 mai

dès le 14 mai : éventuelles pluies



Pluies
contaminatrices
→ Infection

Pluie > 35 mm :
lessivage et infection

Pluie > 20 mm :
lessivage et infection

01/02 mai :
traitement
phytosanitaire

8/9 mai :
traitement
phytosanitaire

12/13 mai :
traitement
phytosanitaire

Fin incubation :
08 mai

Fin incubation :
17 mai

Incubation en cours...

- Après les nombreux litres tombés le 10.05 et le 11.05, l'ensemble de la couverture phytosanitaire est lessivé au sol. Les conditions météorologiques semblent propices et idéales pour renouveler la protection phytosanitaire le 12.05 et/ou le 13.05. Le retour d'éventuelles pluies est prévu dès le 14.05.
- Il est primordial de ne laisser aucune porte d'entrée au champignon en ce mois de mai humide. Le programme de traitement ne doit laisser aucune faille à la maladie.
- Plusieurs infections sont en cours avec des virulences variables. Les premiers symptômes pourraient être visibles prochainement dans le vignoble.
- Agrométéo propose un [modèle pour la maladie](#) avec les différentes infections en cours selon les conditions météorologiques.

RAPPEL :

- **La période pré-florale est capitale pour la lutte anti-mildiou**, aucune faille ne doit résider dans le programme de traitement. Il faut toujours considérer la dilution des produits de traitements dû à la croissance végétative de la vigne et aux averses.
- **Produits de contact** : il est déconseillé de dépasser les 6-7 jours d'intervalle entre deux traitements. Si la protection phytosanitaire arrive au bout de son efficacité, il est nécessaire de réitérer le traitement phytosanitaire avant et au plus proche des prochaines pluies. Lessivage : 15-20mm. Un orage court et très intense à une capacité de lessivage important.
- **Produits pénétrants ou systémiques** : il est déconseillé de dépasser les 8-10 jours d'intervalle entre deux traitements. Lessivage : 40mm.

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 100g et 150g de cuivre métal par hectare.

Stratégie viticulture PI :

Un traitement entre 1kg/ha et 1.25kg/ha de folpet.
Il est nécessaire de consulter l'index phytosanitaire pour le dosage des autres matières actives.

Oïdium

- La vigne approche de la floraison et entre dans sa phase de grande sensibilité face à l'oïdium. Le risque face à la maladie est grandissant en ce moment.
- Tout comme pour le mildiou, il est nécessaire de ne laisser aucune porte d'entrée face à l'oïdium. Le programme de traitement doit être irréprochable et sans faille.
- En cas d'application de soufre, produit de contact, au dernier traitement, il est désormais totalement lessivé avec les nombreux litres tombés ces derniers jours. La fenêtre météo des prochains jours sont opportuns pour renouveler la protection anti-oïdium.
- Agrométéo propose également un [modèle pour la maladie](#) avec les risques selon les conditions météorologiques.

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable à entre 3kg/ha et 4kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- Les premières infections de la maladie se sont déroulées lors des pluies du 28.04. et 29.04. La seconde vague d'infection est survenue après les pluies du 04.05 au 06.05.
- Selon le [modèle d'Agrométéo](#), l'infection est considérée comme faible pour le moment.
- La lutte contre le black-rot est à résonner de la même manière que celle du mildiou : **il est nécessaire de protéger les pluies contaminatrices. En cas de foyer les deux dernières années, il est primordial de positionner un traitement au plus proches des futures pluies pour éviter une nouvelle contamination.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 300g de cuivre métal par hectare couplé avec la dose maximale autorisée en soufre mouillable au stade phénologique du moment, 4kg/ha.

Stratégie viticulture PI :

Pour des conseils de traitements ou matières actives, il est possible de nous contacter. À savoir que les doses des différentes matières actives ainsi que leurs doses d'emploi sont disponibles dans l'index phytosanitaire.