



BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°7 du 20 mai 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot

Météorologie – Phénologie



H : Boutons floraux séparés

Lully. 19.05.26

- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade H : boutons floraux agglomérés**. **Le début de la floraison est tout proche et peut-être déjà visible dans les parcelles très précoces**. La précocité peut varier selon le cépage ou la localisation d'une parcelle.
- Un orage de grêle avec beaucoup d'eau s'est déversée sur certains secteurs du canton vendredi 15.05 en causant des impacts sur les bois, pas de dégâts importants à déclarer.
- Du 14.05 au 16.05, des T°C très fraîches entre 4°C et 11°C accompagnées de plusieurs averses sur le canton :

	Lully	La Plaine	Anières	Satigny	Soral
13-18.05	32mm	21mm	19mm	23mm	28mm

- Les conditions météorologiques du dimanche 17.05 ont été idéales pour positionner un traitement phytosanitaire avec un temps ensoleillé et sec.
- Dès le 19.05, les conditions s'annoncent sèches et ensoleillées pour la suite de la semaine avec des T°C en hausse entre 9°C et 30°C sur le canton.

Mildiou

- **A l'approche de la floraison, la maladie fongique du mildiou est dans une phase de grande sensibilité. Il ne faut laisser aucune porte d'entrée au champignon.**
- De nombreuses infections sont en cours selon [les stations Agrométéo](#) de la région. Le temps d'incubation des infections est largement prolongé dû aux températures froides de la semaine dernière.
- L'humidité de la semaine dernière a été très propice au mildiou, mais les T°C très fraîches ont, malgré les nombreuses infections en cours, ralenti la dynamique du champignon.
- **A ce jour, encore aucun signe de symptôme de la maladie.**
- **Certaines contaminations du début du mois de mai arrivent en fin d'incubation, il sera peut-être possible de trouver les premiers symptômes sur feuille ces prochains jours.**
- Après les pluies de la semaine dernière, une grande majorité de votre dernier traitement se retrouve lessivé au sol. Il sera judicieux de protéger la vigne avant la prochaine pluie pour ne laisser aucune faille à la maladie.
- **La suite de la semaine s'annonce parfaite pour renouveler la protection contre le mildiou. Des températures à la hausse et un temps sec ce qui va relancer la dynamique du champignon dès les prochaines averses.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 150g et 200g de cuivre métal par hectare.

Stratégie viticulture PI :

Un traitement entre 1kg/ha et 1.25kg/ha de Folpet. Il est nécessaire de consulter l'index phytosanitaire pour le dosage des autres matières actives.

- **Produits de contact** : il est déconseillé de dépasser les 6-7 jours d'intervalle entre deux traitements. Si la protection phytosanitaire arrive au bout de son efficacité, il est nécessaire de réitérer le traitement phytosanitaire avant et au plus proche des prochaines pluies. Lessivage : 15-20mm. Un orage court et très intense à une capacité de lessivage important.
- **Produits pénétrants ou systémiques** : il est déconseillé de dépasser les 8-10 jours d'intervalle entre deux traitements. Lessivage : 40mm.

Oïdium

- La vigne approche de la floraison et entre dans sa phase de grande sensibilité face à l'oïdium. Le risque face à la maladie est grandissant en ce moment.
- Les prochaines semaines seront décisives pour l'oïdium, il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur les matières actives agissant contre ce champignon.
- Les conditions météo de ces prochains jours seront **favorables à l'oïdium** avec des T°C douces et de l'humidité stagnante. La pression face au champignon sera en hausse.
- **Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève.**
- Le dernier traitement antérieur aux pluies de la semaine dernière se retrouve totalement lessivé.
- Les prochains jours sont des fenêtres météo idéales pour renouveler la protection et combiner un traitement avec la lutte anti-mildiou.
- Mesures prophylactiques à mettre en œuvre :
 - Aérer la zone des grappes des parcelles sensibles grâce à un travail en vert de qualité pour une meilleure pénétration des produits phytosanitaires.
- **En cas d'attaque déclarée** : un poudrage au soufre (25 kg/ha) aura un effet curatif et éradiquant. Pour que le soufre soit efficace, choisissez une journée sans vent avec beaucoup de chaleur et de luminosité pour l'application.

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable à entre 3kg/ha et 4kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- Selon [Agrométéo](#), plusieurs contaminations sont en cours depuis les nombreuses averses de la semaine dernière. La virulence de ces attaques semble néanmoins de faible ampleur dues aux T°C froides de ces derniers jours.
- La lutte contre le black-rot est à résonner de la même manière que celle du mildiou : **il est nécessaire de protéger les pluies contaminatrices. En cas de foyer les deux dernières années, il est primordial de positionner un traitement au plus proches des futures pluies pour éviter une nouvelle contamination.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 300g de cuivre métal par hectare couplé avec la dose maximale autorisée en soufre mouillable au stade phénologique du moment, 4kg/ha.

Stratégie viticulture PI :

Pour des conseils de traitements ou matières actives, il est possible de nous contacter. À savoir que les doses des différentes matières actives ainsi que leurs doses d'emploi sont disponibles dans l'index phytosanitaire.