

BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°9 du 01 juin 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot
- Flavescence dorée

Météorologie – Phénologie



- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade I : floraison. Elle a débuté la semaine dernière sur les parcelles précoces du canton.** Le stade de la floraison peut varier selon le cépage ou la localisation d'une parcelle.
- Depuis la semaine dernière, les T°C sont caniculaires pouvant atteindre jusqu'à 33°C.
- Les températures de cette semaine s'annoncent moins hautes que la semaine dernière. Des averses sont prévues entre le 02.06 et 05.06 (env. 10mm).

I : Début floraison	I : Pleine floraison
Lully. 29.05.26	Lully. 29.05.26

Mildiou

- Les conditions météorologiques actuelles ne sont clairement pas favorables à ce dernier. La pression du mildiou est faible. Le manque d'humidité des derniers jours et les T°C caniculaires empêchent la maladie de s'installer.
- À ce jour, encore aucun signe de symptôme de la maladie est visible.
- Les dernières infections en cours selon [les stations Agrométéo](#) de la région datent du 20.05. L'incubation est à 100% le 26.05. Depuis aucune autre infection n'est signalée.
- A l'approche de la floraison, la vigne est dans une phase de grande sensibilité face à la maladie du mildiou. Il ne faut laisser aucune porte d'entrée au champignon.
- La croissance de la vigne est très rapide dernièrement, il est judicieux de continuer la protection face au mildiou malgré la pression faible du champignon en ce moment.
- Il sera primordial de protéger la vigne avant la prochaine pluie pour ne laisser aucune faille à la maladie.

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 150g et 200g de cuivre métal par hectare.

Stratégie viticulture PI :

Un traitement de 1.5kg/ha de Folpet.
Il est nécessaire de consulter l'index phytosanitaire pour le dosage des autres matières actives.

- **Produits de contact** : il est déconseillé de dépasser les 6-7 jours d'intervalle entre deux traitements. Si la protection phytosanitaire arrive au bout de son efficacité, il est nécessaire de réitérer le traitement phytosanitaire avant et au plus proche des prochaines pluies. Lessivage : 15-20mm. Un orage court et très intense à une capacité de lessivage important.
- **Produits pénétrants ou systémiques** : il est déconseillé de dépasser les 8-10 jours d'intervalle entre deux traitements. Lessivage : 40mm.

Oïdium

- La vigne est en pleine floraison et est dans sa phase de grande sensibilité face à l'oïdium.
- La pression n'est pas négligeable en ce moment malgré les conditions météorologiques peu favorables à la maladie : très fortes chaleurs, pas d'humidité et très forte luminosité.
- Les prochaines semaines seront décisives pour l'oïdium, la pression risque de grimper avec des averses, des T°C clémentes et un ciel couvert.
- Il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur les matières actives agissant contre ce champignon.
- Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève.
- Les prochains jours sont des fenêtres météo idéales pour renouveler la protection et combiner un traitement avec la lutte anti-mildiou.
- Mesures prophylactiques à mettre en œuvre :
 - Aérer la zone des grappes des parcelles sensibles grâce à un travail en vert de qualité pour une meilleure pénétration des produits phytosanitaires.
- **En cas d'attaque déclarée** : un poudrage au soufre (25 kg/ha) aura un effet curatif et éradiquant. Pour que le soufre soit efficace, choisissez une journée sans vent avec beaucoup de chaleur et de luminosité pour l'application.

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable à entre 4kg/ha et 4.8kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève.
- La lutte contre le black-rot est à résonner de la même manière que celle du mildiou : **il est nécessaire de protéger les pluies contaminatrices. En cas de foyer les deux dernières années, il est primordial de positionner un traitement au plus proches des futures pluies pour éviter une nouvelle contamination.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 300g de cuivre métal par hectare couplé avec la dose maximale autorisée en soufre mouillable au stade phénologique du moment, 4.8kg/ha.

Stratégie viticulture PI :

Pour des conseils de traitements ou matières actives, il est possible de nous contacter. À savoir que les doses des différentes matières actives ainsi que leurs doses d'emploi sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Flavescence dorée

- En 2025, un nouveau cas positif de la maladie a été trouvé au sein du périmètre de lutte obligatoire (PLO) de Dardagny.
- La stratégie pour 2026 est de pulvériser un traitement insecticide à base de pyrèthre contre le vecteur de la maladie (cicadelle *Scaphoideus titanus*). **Ce seul et unique traitement de lutte contre la FD doit être effectué entre le 01.06 et 10.06.**
- **Les quantités de Pyrethrum BioAndermatt (0.6lt/ha) par domaine sont pour la totalité des parcelles dans le PLO.**
- Le pyrèthre est très nocif pour les abeilles et il est important de traiter avant le lever ou après le coucher du soleil.

Symptômes:

- Absence ou dessèchement des inflorescences et des grappes
- Enroulement vers le bas et décolorations des feuilles
- Aoûtement déficient des sarments

