

BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°10 du 8 juin 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot

Météorologie – Phénologie



I : Fin floraison	J : Nouaison
Satigny. 05.06.26	Satigny. 05.06.26

- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade I : fin de la floraison**. Certaines parcelles sont encore en pleine fleur tandis que d'autres sont déjà au stade de la nouaison tout dépend du cépage ou de la localisation de la parcelle.
- Les températures de la semaine dernière ont été plus fraîches après une semaine de canicule. Des T°C variant entre 8 et 25°C.
- Plusieurs averses sont tombées entre le 02.06 et le 05.06 sur la région genevoise variant entre 30mm et 45 mm selon la région genevoise.
- Les températures de cette semaine seront entre 10 et 25°C. Un temps clément et sec est prévu. Attention risque de pluie dans la nuit du 08.06 au 09.06.

Mildiou

- Les conditions météorologiques de la semaine dernière ont été propices au mildiou :
 - Des températures douces et plusieurs averses ont déclenché de nombreuses infections
- Un premier symptôme a été découvert le mardi 02.06 dans une parcelle du Mandement. Même si la virulence est limitée pour le moment, cela prouve que la pression du champignon est présente.
- Plusieurs averses ont lessivé les matières actives appliquées avant les pluies de mardi 02.06. Des orages de fortes intensités et de longues pluies fines ont obligés de renouveler la protection pendant la fenêtre météo du mercredi 03.06 ou en fin de semaine dernière.
- Le traitement de la semaine dernière ainsi que le prochain sont décisifs pour maîtriser la maladie. Le stade de la floraison arrive dans la plupart des cas à son terme, mais la sensibilité de la vigne face au champignon est toujours importante. Il faut rester prudent et ne faut laisser aucune porte d'entrée au champignon.



Premier symptôme 2026 de mildiou sur feuille :
tache d'huile sur la face supérieure et
sporulation sur la face inférieure de la feuille

- La croissance de la vigne a ralenti cette dernière semaine après une croissance très rapide à cause des températures caniculaires de la fin mai.
- **Il sera primordial de protéger la vigne avant la prochaine pluie pour ne laisser aucune faille à la maladie.**
- **Même si la maladie n'est pas virulente en ce moment, ce n'est pas encore le moment d'espacer les traitements.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 250g de cuivre métal par hectare.

Stratégie viticulture PI :

Un traitement entre 1.5kg/ha et 2kg/ha de Folpet. Il est nécessaire de consulter l'index phytosanitaire pour le dosage des autres matières actives.

- **Produits de contact** : il est déconseillé de dépasser les 6-7 jours d'intervalle entre deux traitements. Si la protection phytosanitaire arrive au bout de son efficacité, il est nécessaire de réitérer le traitement phytosanitaire avant et au plus proche des prochaines pluies. Lessivage : 15-20mm. Un orage court et très intense à une capacité de lessivage important.
- **Produits pénétrants ou systémiques** : il est déconseillé de dépasser les 8-10 jours d'intervalle entre deux traitements. Lessivage : 40mm.

Oïdium

- **La vigne est en fin de floraison et est encore dans une phase de grande sensibilité face à l'oïdium.**
- **La pression n'est pas négligeable en ce moment surtout avec les conditions météorologiques favorables à la maladie la semaine dernière : températures clémentes, ciel couvert et plusieurs averses.**
- **Il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur les matières actives agissant contre ce champignon.**
- **Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève.**
- Les prochains jours sont des fenêtres météo idéales pour renouveler la protection et combiner un traitement avec la lutte anti-mildiou.
- Mesures prophylactiques à mettre en œuvre :
 - Aérer la zone des grappes des parcelles sensibles grâce à un travail en vert de qualité pour une meilleure pénétration des produits phytosanitaires.
- **En cas d'attaque déclarée** : un poudrage au soufre (25 kg/ha) aura un effet curatif et éradiquant. Pour que le soufre soit efficace, choisissez une journée sans vent avec beaucoup de chaleur et de luminosité pour l'application.

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable à entre 4.8kg/ha et 6kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève.
- La lutte contre le black-rot est à raisonner de la même manière que celle du mildiou : **il est nécessaire de protéger les pluies contaminatrices. En cas de foyer les deux dernières années, il est primordial de positionner un traitement au plus proches des futures pluies pour éviter une nouvelle contamination.**

Stratégie viticulture biologique :

Un traitement entre 200g et 300g de cuivre métal par hectare couplé avec la dose maximale autorisée en soufre mouillable au stade phénologique du moment, 6kg/ha.

Stratégie viticulture PI :

Pour des conseils de traitements ou matières actives, il est possible de nous contacter. À savoir que les doses des différentes matières actives ainsi que leurs doses d'emploi sont disponibles dans l'index phytosanitaire.