

# Plan suisse de vaccination 2023: résumé

Age	Vaccinations de base									Vaccinations complémentaires		
	Diphtérie Tétanos Coqueluche	Polio- myélite	<i>Haemo- philus influenzae</i> de type b	Hépatite B	Pneumo- coques	Rougeole Oreillons Rubéole	Varicelle	Papillo- mavirus humains Filles	Influenza	Méningo- coques	Papillo- mavirus humains	Zona (herpès zoster)
2 mois	DTP <sub>a</sub>	IPV	Hib	HBV <sup>1</sup>	PCV							
4 mois	DTP <sub>a</sub>	IPV	Hib	HBV <sup>1</sup>	PCV							
9 mois						ROR	VZV					
12 mois	DTP <sub>a</sub>	IPV	Hib	HBV <sup>1</sup>	PCV	ROR	VZV					
24 mois									MCV- ACWY			
4-7 ans	DTP <sub>a</sub> / dTp <sub>a</sub>	IPV										
11-14/15 ans	dTp <sub>a</sub>			HBV <sup>2</sup>				HPV <sup>3</sup>	MCV- ACWY	HPV <sup>3</sup> garçons		
25 ans	dTp <sub>a</sub>									HPV <sup>4</sup>		
45 ans	dT											
≥ 65 ans	dT								annuelle- ment			HZV

**NB:** Les recommandations de vaccination pour des personnes à risque ne figurent pas sur ce résumé.

➤ Pour le détail, veuillez consulter en ligne le [Plan suisse de vaccination 2023 \(OFSP/CFV\)](#)

1. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée prioritairement aux nourrissons.
2. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée aux adolescent-e-s de 11 à 15 ans n'ayant pas encore été vacciné-e-s. Elle comprend alors 2 doses.
3. La vaccination contre les HPV est à privilégier avant le 15<sup>e</sup> anniversaire tant pour les filles (vaccination de base) que pour les garçons (vaccination complémentaire). Elle comprend alors 2 doses.
4. La vaccination de rattrapage contre les HPV pour les jeunes femmes et hommes de 15 à 26 ans nécessite 3 doses.

## Abréviations des vaccins:

d = diphtérie, dose réduite  
P<sub>a</sub> = pertussis  
p<sub>a</sub> = pertussis, dose réduite  
MCV-ACWY = méningocoques des groupes A, C, W et Y

Vaccination combinée