

Plan suisse de vaccination 2025 : résumé

Vaccinations et immunisation passive recommandées

➤ Pour le détail, veuillez consulter en ligne sur www.bag.admin.ch

Age	Vaccinations de base									Vaccinations complémentaires					
	VRS	Diphtérie Tétanos Coqueluche	Polio- myélite	<i>Haemo- philus influenzae de type b</i>	Hépatite B	Pneumo- coques	Rougeole Oreillons Rubéole	Varicelle	Papillo- mavirus humains	Rotavirus	Méningo- coques B	Méningo- coques ACWY	Zona (herpès zoster)	Grippe et COVID- 19	
Naissance	1 dose unique (immunisation passive) pour la 1 ^{re} saison de RSV : peu après la naissance (si né oct.-mars) ou en octobre (si né avr.-sep.)														
2 mois		DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV				RV					
3 mois											B				
4 mois		DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV				RV					
5 mois											B				
9 mois							ROR	VZV							
12 mois		DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV	ROR	VZV							
12-18 mois											B	ACWY			
4-7 ans		DTP _a / dTp _a	IPV												
11-14/15 ans		dTp _a			(HBV) ²			HPV ³		B	ACWY				
25 ans		dTp _a						(HPV) ⁴							
45 ans		dT													
≥ 65 ans		dT				PCV						HZV	annuel		

Légende :

Vaccination de base ou vaccination complémentaire

Vaccination combinée (= une seule piqûre contenant plusieurs vaccins)

Abréviations :

d = diphtérie, dose réduite
P_a = pertussis (= coqueluche)
p_a = pertussis, dose réduite
ACWY = méningocoques des groupes A, C, W, Y
B = méningocoques B

NB: Les recommandations de vaccination pour des personnes à risque ne figurent pas sur ce résumé.

Notes :

1. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée prioritairement aux nourrissons.
2. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée aux adolescent-e-s de 11 à 15 ans n'ayant pas encore été vacciné-e-s. Elle comprend alors 2 doses.
3. La vaccination contre les HPV pour les garçons et les filles est à privilégier avant le 15^e anniversaire. Elle comprend alors 2 doses.
4. La vaccination de rattrapage contre les HPV pour les jeunes femmes et hommes de 15 à 26 ans nécessite 3 doses.

