

Plan suisse de vaccination 2024 : résumé

➤ Pour le détail, veuillez consulter en ligne sur www.bag.admin.ch

Age	Vaccinations de base								Vaccinations complémentaires				
	Diphtérie Tétanos Coqueluche	Polio- myélite	<i>Haemo- philus influenzae</i> de type b	Hépatite B	Pneumo- coques	Rougeole Oreillons Rubéole	Varicelle	Papillo- mavirus humains	Rotavirus	Méningo- coques B	Méningoc- oques ACWY	Zona (herpès zoster)	Influenza
2 mois	DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV				RV				
3 mois										B			
4 mois	DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV				RV				
5 mois										B			
9 mois						ROR	VZV						
12 mois	DTP _a	IPV	Hib	HBV ¹	PCV	ROR	VZV						
12-18 mois										B	ACWY		
4-7 ans	DTP _a / dTp _a	IPV											
11-14/15 ans	dTp _a			(HBV) ²				HPV ³		B	ACWY		
25 ans	dTp _a							(HPV) ⁴					
45 ans	dT												
≥ 65 ans	dT				PCV							HZV	annuel

Légende :

Vaccination de base, ou
vaccination complémentaire

Vaccination combinée (= une seule
piqûre contenant plusieurs vaccins)

Abréviations :

d = diphtérie, dose réduite

P_a = pertussis (= coqueluche)

p_a = pertussis, dose réduite

ACWY = méningocoques des groupes
A, C, W, Y

B = méningocoques B

Notes :

1. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée prioritairement aux nourrissons.

2. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée aux adolescent-e-s de 11 à 15 ans n'ayant pas encore été vacciné-e-s. Elle comprend alors 2 doses.

3. La vaccination contre les HPV pour les garçons et les filles est à privilégier avant le 15^e anniversaire. Elle comprend alors 2 doses.

4. La vaccination de rattrapage contre les HPV pour les jeunes femmes et hommes de 15 à 26 ans nécessite 3 doses.

NB: Les recommandations de vaccination pour des personnes à risque ne figurent pas sur ce résumé.

