

Poštovani Roditelji,

Epidemija bronhiolitisa obično počinje na jesen i završava se krajem zime, a često je uzrokovana respiratornim sincicijalnim virusom (RSV). Reč je o potencijalno ozbiljnoj respiratornoj infekciji koja izaziva upalu malih bronhija i pogađa decu mlađu od 12 meseci – novorođenčad mlađa od tri meseca imaju veći rizik od komplikacija i hospitalizacije.

Simptomi bronhiolitisa su sledeći :

- kašalj
- groznica
- zapušen nos
- poteškoće s disanjem

Ako vaša beba ima ove simptome, odmah se obratite njenom pedijatru. U slučaju ozbiljnih znakova poput promene ponašanja, smanjene reaktivnosti bebe, slabijeg uzimanja hrane, vrlo brzog, usporenog ili nepravilnog disanja, ili ako usne ili ekstremiteti poplave, odvedite je direktno u hitnu službu.

Preporučuju se jednostavne mere prevencije :

- Pre navršениh 3 meseca, ograničiti posete na bliski krug odraslih koji nisu bolesni
- Oprati ruke (ili koristiti dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola) pre i posle dodira s bebom
- Nositi masku u slučaju prehlade, kašlja ili groznice
- Ako braća i sestre imaju simptome virusne infekcije, držati ih po mogućnosti što dalje od bebe tokom akutne faze infekcije
- Izbegavati, ako je moguće, porodična okupljanja i boravak na javnim mestima

Danas je dostupan preventivni tretman : Beyfortus®. Ovaj lek na bazi antitela (imunizacija) smanjuje rizik od infekcije RSV-om kod dece, kao dodatak merama prevencije. Daje se u jednoj dozi putem intramuskularne injekcije.

Preporučuje se Beyfortus® za svu novorođenčad i odojčad mlađu od godinu dana. Troškovi Beyfortus®-a i njegove primene pokriveni su zdravstvenim osiguranjem, uz izuzetak participacije od 10 %.

Idealno bi bilo da se Beyfortus® primenjuje :

- Tokom oktobra za decu rođenu između aprila i septembra 2024. godine.
- U prvim danima života za decu rođenu između oktobra 2024 i kraja marta 2025. godine.

Kao svaki lek, Beyfortus® može izazvati nuspojave. Iako su retki, moguće nuspojave su :

- osip
- reakcija na mestu primene (crvenilo, otok i bol)
- groznica
- u retkim slučajevima, alergijska reakcija

Ove nuspojave mogu se pojaviti do nekoliko dana posle injekcije. Obično su blage do umerene i kratkog trajanja.

Kantonalna lekarska služba, Univerzitetske bolnice u Ženevi i Ženevsko udruženje za pedijatriju tople preporučuju ovaj tretman za vašu decu.

Za više informacija, posetite internet sajt kantonalne lekarske službe na adresi <https://www.ge.ch/c/rsv>



Detalje o primeni tretmana možete dobiti tokom boravka u kantonalnim porodilištima ili od pedijatra vašeg deteta.

Dr Simon Regard,
Zamenik kantonalnog lekara

Dr Arnaud L’Huillier
Odgovorni lekar, Jedinica za dečje infektivne bolesti, HUG

Dr Jean-Yves Corajod,
Ženevsko udruženje za pedijatriju