

Değerli Ebeveynler,

Çoğunlukla solunum sinsityal virüsünün (RSV) neden olduğu bronşiyolit salgını genellikle sonbaharda başlayıp, kış sonunda biter. Bu, küçük bronşların iltihaplanmasına neden olan ve 12 aydan küçük çocukları etkileyen ciddi olabilecek bir solunum yolu enfeksiyonudur. Üç aydan küçük bebeklerde ise komplikasyon ve hastaneye yatış riski daha yüksektir.

Bronşiyolitın belirtileri şu şekildedir:

- Öksürük
- Ateş
- Tıkanmış burun
- Nefes alma zorluğu

Bebeğinizde bu belirtiler varsa hemen bir çocuk doktoruna başvurun. Davranışlarda değişiklik, tepkilerin azlığı, iştahsızlık, çok hızlı veya çok yavaş ya da düzensiz nefes alma veya dudaklarının veya dudak uçlarının morarması gibi ciddi belirtilerde, bebeği doğrudan acile götürün.

Basit önleyici tedbirler tavsiye edilir:

- 3 aylık olana kadar, ziyaretleri hasta olmayan yakın yetişkinlerle sınırlayın
- Bebeğinize dokunmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın (veya hidroalkolik bir solüsyon kullanın)
- Soğuk algınlığınız, öksürüğünüz veya ateşiniz varsa maske takın
- Diğer kardeşler viral enfeksiyon belirtileri gösteriyorsa, enfeksiyonun akut fazı sırasında onları mümkün olduğunca bebekten uzak tutun
- Mümkünse aile toplantılarından ve halka açık yerlerden kaçının

Artık önleyici bir tedavi mevcuttur: Beyfortus®. Antikor (bağışıklama) temelli bu ilaç, alınan önlemlere ek olarak çocuklarda RSV enfeksiyonu riskini azaltır. Kas içi enjeksiyon yoluyla tek bir dozda uygulanır.

Beyfortus® tüm yeni doğanlar ve bir yaşın altındaki bebekler için tavsiye edilir. Beyfortus® ve uygulama masrafları, %10'luk katkı payı haricinde sağlık kasaları tarafından karşılanır.

Beyfortus® ideal olarak:

- Nisan ve Eylül 2024 tarihleri arasında doğan bebeklere Ekim ayında
- Ekim 2024 ile Mart 2025 sonu arasında doğan bebeklere doğdukları ilk günlerde uygulanmalıdır.

Her ilaçta olduđu gibi, Beyfortus® de istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Nadiren de olsa, olası yan etkiler:

- Cilt döküntüsü
- Enjeksiyon bölgesinde tepki (kızarıklık, şiş ve ağrı)
- Ateş
- Çok nadir durumlarda alerjik reaksiyon görülebilir.

Bu yan etkiler enjeksiyondan birkaç gün sonrasına kadar ortaya çıkabilir. Genellikle hafif veya orta şiddette ve kısa sürelidir.

Kanton Hekimi Servisi, Cenevre Üniversite Hastaneleri ve Cenevre Pediatri Derneđi çocuklarınız için bu tedaviyi şiddetle tavsiye eder.

Daha fazla bilgi için, kanton hekimi servisinin İnternet sayfasına bakın

<https://www.ge.ch/c/rsv>



Tedavi prosedürü size kantonun doğum ünitelerinde kaldığımız süre boyunca veya çocuđunuzun doktoru tarafından anlatılabilir.

Dr Simon Regard,
Kanton Hekimi yerine

Dr Arnaud L’Huillier
Ünite Sorumlusu Hekim, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, HUG

Dr Jean-Yves Corajod,
Cenevre Pediatri Derneđi