

Profitez d'une consultation pour vérifier que tous les vaccins de vos patients de 65 ans et plus sont à jour.

GRIPPE, COVID, TÉTANOS, DIPHTÉRIE, PNEUMOCOQUES, VRS, ZONA

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Quels vaccins recommander à mes patients de 65 ans et plus ?

COVID-19

65 ans et plus | 1 dose – chaque année

Une dose d'un vaccin adapté aux variants circulants, chaque année dès septembre, au moins six mois après la dernière dose ou après une infection avérée.

Zona

65 ans et plus | 2 doses à 2 mois d'intervalle

Vaccin sous-unitaire (Shingrix®) : 2 doses à 2 mois d'intervalle (1-6 mois possible).

2 doses également recommandées en cas de vaccination antérieure avec le vaccin vivant atténué Zostavax®, avec 1re dose ≥ 2 mois plus tard.

Vaccin recommandé indépendamment des antécédents de varicelle ou de zona.

Si zona aigu, attendre la guérison des lésions cutanées avant de vacciner.

Pneumocoques

65 ans et plus | Dose unique

Vaccin recommandé pour toutes les personnes ≥ 65 ans.

Si jamais vacciné : **1 dose unique de Prevenar 20® (PCV20) ou de Capvaxive ® (PCV21)** – les 2 options sont équivalentes.

Si déjà vacciné avec :
PCV13 : 1 dose de PCV21 ou PCV20 ≥ 1 an plus tard pour élargir la couverture sérotypique (≠ rappel) .
PCV15 : 1 dose de PCV21 ≥ 1 an plus tard pour élargir la couverture sérotypique (≠ rappel).
PCV20 ou PCV21 : pas de rappel nécessaire.
PPV23 (Pneumovax - n'est plus recommandé) : 1 dose de PCV20 ou PCV21 ≥ 1 an plus tard.

Co-administration : Tous les vaccins peuvent être administrés lors de la même consultation. En cas d'injections multiples, respecter un intervalle minimal de 2,5 cm entre les sites d'injection des deux bras (deltoïdes).

VRS (virus respiratoire syncytial)

75 ans et plus | 65 ans et plus si à risque | 1 dose unique

Une dose, idéalement entre mi-octobre et mi-novembre.

La nécessité d'un rappel est en cours d'évaluation.

Dès 65 ans en cas de risque accru : immunodéficience, maladies pulmonaires chroniques, cardiovasculaires, neurologiques ou neuromusculaires, insuffisances rénales chroniques, maladies hépatiques chroniques, maladies hématologiques, diabète, personnes fragiles et résidents d'EMS ou d'établissements de soins de longue durée.

Diphtérie – tétanos

65 ans et plus | Rappel tous les 10 ans

Pour les personnes qui ont reçu une vaccination de base complète (≥ 3 doses), rappel recommandé à 65 ans, **puis tous les dix ans** (65, 75, 85, 95 ans…).

Vaccin combiné avec la coqueluche en cas de contacts réguliers avec des nourrissons de < 6 mois (petits-enfants).

Grippe

65 ans et plus | 1 dose – chaque année

Vaccination annuelle, à débuter entre mi-octobre et le début de la vague de grippe.

Dose élevée (Efluelda®) recommandée dès 75 ans, ou dès 65 ans avec un facteur de risque supplémentaire.

Co-administration possible avec le vaccin contre le COVID-19 et le VRS (avec tous les autres vaccins).

Commentaires : Toutes ces vaccinations sont autorisées et recommandées. Elles sont remboursées par l'assurance-maladie de base, sans franchise, sauf le vaccin contre le VRS, qui n'est pas encore remboursé.

Informations complémentaires : www.vacciner-suisse.ch et www.infovac.ch